

| Sammelart Pflaume | Blüte | | Erntezeitpunkt | Früchte | Wuchs des Baumes | Anfälligkeit für Krankheiten | Baum- und Standort-eigenschaften | Geschmack / Fruchtfleisch | Verwendung | Bemerkungen |
|--|-------|------|----------------|---------|------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| | früh | spät | | | | | | | | |
| Empfehlenswerte Sorten Die Informationen wurden in der Regel aus: Silbereisen, Götz & Hartmann (1996): "Obstsortenatlas"; Störzter, Wolfram, Schuricht & Männel (1992): "Steinobst" und Einzelliteratur entnommen. | | | | | | | | | | |

| Zwetschen und Pflaumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---------|----------------|---------|------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|--|---|--|--|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|-----|--|--|--|---|
| Sorte | früh | spät | Blüte | Erntezeitpunkt | Früchte | Wuchs des Baumes | Anfälligkeit für Krankheiten | Baum- und Standort-eigenschaften | Geschmack / Fruchtfleisch | Verwendung | Bemerkungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anna Späth | | x | S | x | | | | | | | süß mit feiner Säure, würzig; mit festem, saftigem Fleisch | die dicke zähe Haut ist beim Frischverzehr störend; nicht immer steinlösend | nicht auf trockene Böden; etwas unregelmäßige Erträge; befriedigt nur in warmen Lagen (Weinbauklima); verträgt Windlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belle de Louvain / Schöne von Löwen | | x | (S) + F | x | | | | | | | stf | x | süß, mäßig sauer, schwach, doch nicht hervorragend gewürzt, etwas fest, wird leicht mehlig | eher für die Verarbeitung, als Tafelobst nicht von erster Güte, löst sich zum Teil schlecht vom Stein; gut transportierbar | hohe und regelmäßige Erträge; robuste Sorte mit geringen Standortansprüchen; wurde früher vielfach als Stammbildner für andere Sorten verwendet | | | | | | | | | | | | | |
| Belle de Thuin (RGF*) (1) | x | | F | x | | | | | | | g | m | s-m | g | st | x | h | (x) | sehr saftige, gelbe, süße Pflaume, leicht säuerlich | sehr gute Tafelfrucht (sehr groß); leicht steinlösend | gelbe belgische Pflaume die als RGF-Sorte (1) vom Centre de Recherches agronomiques de Gembloux empfohlen wird; benötigt eine Befruchtersorte (z.B. Prune de Prince); sehr fruchtbare Sorte | | | | | | | |
| Bleue de Belgique | x | x | | x | | | | | | | m | | | | | | | | (x) | süßlich, erfrischend, angenehm säuerlich, Fleisch fest und saftig | gute bis sehr gute Tafelfrucht zum Frischverzehr, häuslich vielseitig verwendbar, die Angaben zur Steinlöslichkeit widersprechen sich | Früchte hängen windfest; | | | | | | |
| Bühler Frühzwetsche | | (x) | x | S | x | | | | | | g | g | g | st | g | | | | x | frische, z.T. sehr kräftige Säure, die sich nach der Ernte rasch abbaut, relativ niedriger Zuckergehalt; Schale sauer, zäh und hart | mittel bis gut für den Frischverzehr; gelegentlich zum Brennen (jedoch oft zu wenig Zucker); sehr gut für Saft; an zusagenden Standorten voll steinlösend | in warmen Lagen sehr wertvolle Frühzwetsche; verlangt feuchte Böden; hohe Erträge, ausgeprägte Alternanz bei fehlender Pflege | | | | | | |
| Czar (The Czar) / Czarpflaume | | x | S | x | | | | | | | g | | m | m-st | st | | | | | (x) | angenehm süßsäuerlich, schwach würzig; Haut sauer, aber beim Frischverzehr kaum störend, beim Kochen Säure stärker hervortretend; Fleisch mittelfest | frisch und Konserve mit Stein, besonders für Kompott; gut steinlösend | hohe und regelmäßige Erträge; nicht in trockenen Böden; auch noch in höheren Lagen anbauwürdig | | | | | |
| Ersinger Frühzwetsche | | x | (S) | | | | | | | | m | s | s | st | g | | | | | | von warmen Standorten und vollreif süß, angenehm würzig und säuerlich erfrischend; mäßig fest bis weiches Fleisch, sehr saftig | gute Tafelfrucht, Kompott, Marmelade, Kuchen, nicht geeignet zum Einmachen; relativ gut steinlösend | verlangt kräftige Böden; nur im milden Klima anbauwürdig; hohe und regelmäßige Erträge (alternierende Erträge bei fehlender Pflege); nur teilweise selbstfruchtbar, für entsprechende Befruchter sollte gesorgt werden; nicht für feuchte Lagen | | | | | |
| Fellenberg / Quetsch d'Italie / Altesse Double | | | x | (S) + F | x | | | | | | g | s | | m-st | st | | | | | | x | g-m | g-m | x | süß, mit angenehm, erfrischender Säure, in Vollreife sehr aromatisch; geschmacklich hochwertige Früchte | v.a. für Frischverzehr, aber auch Konserve, Marmelade, Dörrfrucht und Brennen; sehr gut steinlösend | oft nicht befriedigende Erträge, die auch stark von der jeweiligen Witterung während der Blüte abhängen; Blüten reagieren sehr empfindlich auf tiefe Temperaturen; in kühleren Lagen oft bessere Erträge weil die Sorte hier später blüht und dann meist höhere T. herrschen; reift hier im Herbst auch noch gut aus | |
| Hauszwetsche / Altesse Simple / "Hausquetsch" | | | x | S | x | | | | | | g | | g | m | st | st | | | | | | g-m | | (x) | ausgeglichen süßsauer, würzig, leicht bitterliche Haut, mit typischem "Zwetschenaroma"; Fleisch knorpelig-fest, mäßig saftig | sehr vielseitig: zur Musbereitung (Quetschekraut), als Konserve, zum Trocknen, frisch, als Kuchenbelag, zum Brennen; meist gut steinlösend | sehr wertvolle Sorte: sehr anpassungsfähig an Boden und Klima, gedeiht selbst auf trockenen, flachgründigen Böden; auch Windlagen sind noch für den Anbau geeignet; in kühleren Lagen reift die Sorte oft nicht aus; hohe Erträge, die alternieren können | |
| Monsieur Hâtif (Prune Monsieur) | | x | x | F | | | | | | | | | | m-st | | | | | | | | | x | | süß, mittelfestes und mittelsaftiges Fleisch | gute Tafelfrucht zum Frischverzehr, sehr gut für Verarbeitung in der Küche, gut steinlösend | wechselnde, nicht immer befriedigende Fruchtbarkeit; sehr robuste Sorte | |
| Opal | | x | | S | x | | | | | | | | | m | g | | | | | | | | x | g | x | süßlich mit schwacher Säure, aromatisch; mittelfestes Fleisch mit mittlerem Saftgehalt | gute Frühpfleume zum Frischverzehr; gut steinlösend | regelmäßige und sehr hohe Erträge; auch noch für rauhere Lagen geeignet |
| Ortenauer Zwetsche | | x | x | (S) + F | | | | | | | | | | s-m | st | st | | | | | | | h | x | | zweitschenartiger Geschmack, der nur in warmen Lagen vollbefriedigend ist; festes Fleisch | Tafel- und Verwertungsfrucht; Steinlöslichkeit gut bis mäßig | hohe und regelmäßige Erträge |
| Prenzepprom / Prune de Prince | | x | | S | x | | | | | | g | g-m | g | g | s-m | | | | | | | | | x | | mirabellengroße, sehr süße Frucht, wenig saftig, Schale leicht säuerlich; Fruchtfleisch je nach Reifestadium fest-knackig bis weich | früher sehr beliebte Frucht zum Frischverzehr, für Kompott, Konfitüre und zum Trocknen; bei Vollreife gut steinlösend | Lokalsorte aus dem belgischen und französischen Teil von Lothringen und dem Luxemburger Gutland; hohe und regelmäßige Erträge; Früchte selten mit "Wurm"-Befall |
| Sainte-Catherine (RGF*) | | x | x | | | | | | | | g | g | g | g | m | | | | | | | | | x | | große gelbe Pflaume mit festem Fruchtfleisch | relativ gute Tafelfrucht, sehr gut für Kompott, Konfitüre und Kuchen; nur mittelmäßig steinlösend | hohe und regelmäßige Erträge |

(1): Es ist nicht sicher, ob es sich bei der in Luxemburg im Handel befindlichen Sorte wirklich um die hier beschriebene Sorte handelt
 *RGF: Ressources Génétiques Fruitières: alte, robuste Sorten, die in der Landschaft und in alten Streuobstbeständen gefunden worden sind und nach längerer Beobachtung und Einschätzung für den Anbau empfohlen werden

| Sammelart Pflaume | Blüte | | Erntezeitpunkt | | | Früchte | | | Wuchs des Baumes | | Anfälligkeit für Krankheiten | | | Baum- und Standortseigenschaften | | | Geschmack / Fruchtfleisch | Verwendung | Bemerkungen |
|--|-------|--------|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|---------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| | früh | mittel | spät | Selbst- oder Fremdbefruchtung | guter Pollenspender | Transportierbarkeit | Platzfestigkeit bei Regen | Früchte bei Vollreife schüttelbar | Fruchtfäule bei Regenperioden | Schwach / mittel / stark | Schakaanfälligkeit v.a. in warmen Lagen | Anfälligkeit für Narrentaschenkrankheit | Monilia | Frostempfindlichkeit der Blüten | Frostempfindlichkeit des Holzes | bevorzugt geschützte, wärmere Lagen | | | |
| Empfehlenswerte Sorten Die Informationen wurden in der Regel aus: Silbereisen, Götz & Hartmann (1996): "Obstsortenatlas"; Störzter, Wolfram, Schuricht & Männel (1992): "Steinobst" und Einzelliteratur entnommen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Zwetschen und Pflaumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stanley | | x | | S | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wangenheims Frühzwetsche | | | | S | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wignon (RGF*) | | x | | S | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zimmers Frühzwetsche | x | x | | F | | x | x | | | | | | | | | | | | | |

| Renekloten und Mirabellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Althanns Reneklude / Reine Claude Comte d'Althann / In Belgien auch "Reine-Claude Conducta" genannt (2) | | | x | | F | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Bavay Reneklude / Reine-Claude de Bavay | x | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frühe Reneklude / Reine-Claude Hätive / Early Green Gage | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Große Grüne Reneklude / Reine-Claude Dorée (Reine-Claude Dorée-Crottée) | | x | | F | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kirke's Pflaume / Kirkes Plum | | x | x | S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metzer Mirabelle / Mirabelle de Metz | | x | | (F) | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nancymirabelle / Mirabelle de Nancy (die virusfreie französische Auslese Nr. 1510 wird empfohlen) | | | x | S | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontariopflaume | | x | x | S | x | x | | | | | | | | | | | | | | |

(2): In Belgien wurde lange Zeit die Sorte "Conducta" unter dem Namen "Reine Claude d'Althann" gehandelt. Hierbei handelt es sich um eine Verwechslung, denn bei der Sorte "Conducta" handelt es sich um eine andere Sorte, die der "Althanns" in vielen Punkten unterlegen ist.
 *RGF: Ressources Génétiques Fruitières: alte, robuste Sorten, die in der Landschaft und in alten Streuobstbeständen gefunden worden sind und nach längerer Beobachtung und Einschätzung für den Anbau empfohlen werden

Nicht empfehlenswerte Sorten:

Casaka Beste, Casaks Frühe, Casaks Schöne, Elena, Hanita Zwetsche, Herman, Katinka (Zwetsche), Magna Glauca, President (Pflaume), Ruth Gerstetter, Valor

Als nicht empfehlenswert gelten: rezente Züchtungen für den Ertragsobstbau, Sorten mit sehr hohen Ansprüchen an Boden und/oder Klima, sehr krankheitsanfällige Sorten, Sorten mit sehr hohem Pflegeaufwand